

Выписка из истории болезни
Грициенко Александр Андреевич
02.09.2004 года рождения

Клинический диагноз: хронический интерстициальный нефрит после перенесенного ГУС с нарушением концентрационной способности почек.

Морфологический диагноз: с-м Альпорта с тугоухостью.

Сопутствующее заболевание: ДЖВС

Ребенок находился в нефрологическом отделении ОДКБ с 3.12.15 по 11.12.15

При поступлении в анализах мочи белок 1.65 г/л, СРБ-1.2 гр в сутки, АД 110/65 мм рт ст.

Из анамнеза заболевания – в 1.5 года перенес ГУС. Тогда 17 дней анурия. В 12.2008 года на биопсии – базальные мембраны волокнистые. Из 24 клубочков – 2 склерозировано, 10 в состоянии некроза, очаги некроза в интерстиции, стенки артериол утолщены, склерозированы, подоциты распластаны на значительном протяжении. Биопсия в 2012 году – из 8 клубочков 4 склерозированы, 4 со слабой гиперклеточностью мезангия с расширением парамезангиальных зон. С3 комплемент в канальцах. Базальные мембраны на значительном протяжении клубочков менее 200 нм. В интерстиции диффузно-очаговый умеренный фиброз, слабая очаговая лимфо-гистиоцитарная инфильтрация. В динамике б/х крови без особенностей, ОАМ белок 0.99 – 1.65-3.3 г/л . Объективно при поступлении по органам и системам без особенностей

дата	Эритроциты $\times 10^{12}$	Гемоглобин г/л	ЦП	Тромбоциты $\times 10^9$	Лейкоциты $\times 10^9$	Б.	Э	М	Ю	П	С	Лимф	Мон	СОЭ
04.12.15	4.8	134	0.8	361	6.4	-		-	-					11

2. б/х крови

Дата	08.12.14	04.12.15
Об. белок	68.6	70.4 г/л
Альбумин	40.6	38 г/л
Мочевина	5.2	6.0 ммоль/л
Глюкоза	5.4	5.7 ммоль/л
Билирубин общ.	6.67	6.7 ммоль/л
АСТ	22.2	31.6 ед/л
АЛТ	10.0	10.7 ед/л
холестерин	6.5	7.1 ммоль/л
Креатинин	76.2	69.9 мкмоль/л

3. ОАМ

Дата	белок	Лейкоциты	Эритроциты	Цилиндры	Соли
04.12.15	1.65	1-2	1-2 изм	0-1 гиал	-
07.12.15	3.3	2-3	2-3 изм	0-1 гиал	-
08.12.15	0.99	2-4	4-6 изм	0-1 гиал	-
09.12.15	0.33	2-3	1-2 имз	1-3 гиал	-

УЗИ почек - правая 83x39x13, левая 82x33x13 контуры неровные гиперэхогенные, паренхимы повышенная эхогенность с мелкими гиперэхогенными включениями, кмд снижена. От контура правой почки в паренхиму идут гиперэхогенные линейные структуры. Срединный комплекс в обеих почках гиперэхогенный, члс с 2х сторон сомкнута, лоханки справа 5 мм, лоханка слева 4

мм. Подвижность, положение почек в норме. Кровоснабжение при ЦДК кровотоков фрагментарно только в медуллярном слое. Мочевой пузырь – без особенностей.

УЗИ брюшной полости – гепатомегалия, желчный пузырь без особенностей

Моча на стерильность – E.faecalis 10²

Пр.Зимницкого уд вес 1005-1013

СПБ 8.12.15 -1.5 гр, 10.12.15 – 660 мг

Получала лечение: -

Рекомендовано: 1. диета 5

2. Эссенциале 1 кап х 3 раз в мес.

3. Хофитол 1 таб х 3 раз в день 1 мес.

4. Супракс 160 мг х 2 раз в день 7 дней, затем фурамаг 100 мг х 2 р в день 7 дней

5. ломилан 5 мг на ночь 14 дней

6. бифиформ 1 т х 3 р в день 14 дней

7. фитотерапия; спорыш, ромашка, тысячелистник чередуя петрушка, зверобой, толокнянка.

8 ОАМ, СПБ 1 р в 10 дней. Наблюдение нефролога 1 р в 2 мес. Контроль мочевины, креатинина, калия крови, ОАК тр св 1 раз в мес, пр. Зимницкого 1 раз в мес.

Заведующий нефрологическим отделением

Негода В.М

Лечащий врач

Кожин А.А.