

Протокол операции № 449

ВМП: Радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией (КСГ VS1615.09.00.15.002)

Пациент Хлюпина Галина Викторовна, женщина, возраст 51 год, номер карты 11255-С, госпитализация 16.05.2016 11:06.

Оперирующее отделение: Онкологическое (хирург) отд N2

Дата операции 18.05.2016 **Время начала операции** 13:15

Дата окончания операции 18.05.2016 **Время окончания операции** 15:15

Продолжительность операции 2 ч.

К/д до операции 2

Диагноз до операции:

C50.4 Злокачественное новообразование верхненаружного квадранта молочной железы

Диагноз после операции:

C50.4 Злокачественное новообразование верхненаружного квадранта молочной железы

Операция: плановая

Наименование операции: ВМП: Радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией (КСГ VS1615.09.00.15.002)

Обезболивание: эндотрахеал.наркоз

Ведущий хирург: Луганский Станислав Викторович, Онкологическое (хирург) отд N2, Врач-онколог

Операционная бригада:

Ассистент - Черномазов Владимир Николаевич

Врач-анестезиолог - Казакова Ольга Петровна

Операционная медсестра: Ключникова Татьяна Ивановна

Осложнения во время операции:

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ:

Под комбинированным наркозом двумя сходящимися разрезами рассечена кожа вокруг квадранта правой молочной железы. Кожные лоскуты широко отсепарованы в стороны: медиально до границы верхних квадрантов, вверх до ключицы, латерально заходя на 2-3 см ниже края широчайшей мышцы спины и вниз до субареолярной зоны. Рассечена ткань молочной железы до фасции большой грудной мышцы. Отсепарована фасция, покрывающая большую грудную мышцу в латеральную сторону. Выделены, пересечены и перевязаны сосуды, идущие к малой грудной мышце. Последняя пересечена у мест прикрепления. Выделена тупым и острым путем подмышечная клетчатка трех уровней (подключично-подлопаточно-подмышечной зоны) с лимфоузлами со скелетированием подключичных и подлопаточных сосудов. Квадрант молочной железы удален единым блоком с фасцией, покрывающей большую грудную мышцу, малой грудной мышцей, подмышечной клетчаткой.

Ложе опухоли маркировано 4 р-контрастными клипсами.

Мобилизована часть широчайшей мышцы спины на питающей ножке, подведена в область удаленного квадранта, прификсирована к большой грудной мышце, грудной стенке, тем самым воссозданы объем молочной железы и подкрыльцовой ямки.

Гемостаз выполнен электрокоагуляцией лигированием. Рана дренирована через контраппертуру устройством для дренирования ран 4x10мм (1 устройство).

Швы на кожу с натяжением. Спирт. Асептическая повязка.

Вес препарата 300 г. Кровопотеря 200 мл.

Класс операции: Класс I (чистые раны): неинфицированная послеоперационная рана без признаков воспаления.

Препарат: квадрант правой молочной железы с опухолью, подмышечная клетчатка 3-х уровней.

Во время операции использовано: викрил 3 0 игла 26мм - 1уп(12шт), сурджилактин 210(3) -2шт, устройство для дренирования ран 4x10мм -2, кетгут-4 с иглой - 1, электрод-лезвие с EDGE-покрытием (E1450G) - 1, рассеивающий REM-электрод с гидрогелем PolyHesive II для взрослых (E7507) - 1, инструмент Liga Sure Precise (LS 1200) - 1, инструмент Liga Sure Precise Plus (LF1212) - 1, инструмент Liga Sure Std (LS2071), ручка электрохирургическая Surg-N-Vac с адаптером 22мм (INS-300-0110\EU) - 1, фильтр RapidVac (SEA370), очиститель электродов абразивный LectoBresive - 1, Liga Clip Extra (1 камридж) — 1шт.

Больная переведена в ОАР.

Врач-онколог

Луганский Станислав Викторович

18.05.2016